

# ไขหวัดใหญ่ระบาดใหญ่มีความแตกต่างอย่างไร? ข้อเท็จจริง

## ไขหวัดใหญ่แบ่งออกได้หลายประเภท

### ประเภทที่เป็นที่รู้จักกันทั่วไป มี 4 ประเภท ดังนี้

ไขหวัดใหญ่ระบาดใหญ่คือเชื้อไวรัสไขหวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ที่ไม่เคยแพร่กระจายในคนมาก่อน ไขหวัดชนิดนี้ไม่ใช่ไขหวัดทั่วไปหรือไขหวัดใหญ่ตามฤดูกาล และเป็นคนละชนิดกับไขหวัดนกและไขหวัดหมู

#### ไขหวัดใหญ่ตามฤดูกาล



- เป็นโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจของคนซึ่งมีสาเหตุจากเชื้อไวรัส
- โดยปกติเป็นโรคที่ไม่ร้ายแรง แต่อาจมีอันตรายรุนแรงและถึงแก่ชีวิตได้หากเกิดในผู้สูงอายุและเด็กเล็ก
- อาการที่พบคือ มีไข้ น้ำมูกไหล ไอ จาม และปวดศีรษะ เป็นต้น
- ไวรัสชนิดนี้มีการแพร่เชือกันในรูปแบบที่คาดเดาได้
- เป็นเชื้อที่แพร่ตามฤดูกาล
- มีวัคซีนพื้นฐานที่ใช้อย่างกว้างขวาง

#### ไขหวัดนก




- เป็นเชื้อไวรัสที่แพร่ระบาดในนก และเป็นคนละชนิดกับเชื้อไวรัสไขหวัดใหญ่ในคน
- เป็นโรคที่ติดต่อกันคนสูคน
- อาจมีการติดต่อสูคนได้
- อาจกลายพันธุ์เป็นเชื้อไวรัสที่ติดต่อกันคนสูคนได้

#### ไขหวัดหมู



- เป็นเชื้อไวรัสที่แพร่ระบาดในสุกร และเป็นคนละชนิดกับเชื้อไวรัสไขหวัดใหญ่ในคน
- โดยส่วนใหญ่แพร่กระจายโดยการติดต่อกันคนสูคน
- อาจมีการติดต่อสูคนได้ในกรณีที่มีการสัมผัสใกล้ชิดกับสุกร
- อาจกลายพันธุ์เป็นเชื้อไวรัสที่ติดต่อกันคนสูคนได้

#### ไขหวัดใหญ่ระบาดใหญ่



- อาการที่พบคล้ายกับไขหวัดใหญ่ตามฤดูกาล แต่โดยทั่วไปจะมีความร้ายแรงกว่า และภาวะแทรกซ้อนมีแนวโน้มที่จะรุนแรงกว่า
- เนื่องจากมีสาเหตุมาจากไวรัสสายพันธุ์ใหม่ คนจึงไม่มีภูมิคุ้มกันโรคเหล่านี้
- มีการระบาดของโรคไปทั่วโลก
- เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนัก แต่เวียนกลับมาเกิดได้ซีก (ทุกๆ 10 - 42 ปี)
- ส่งผลกระทบต่อผู้คนจำนวนมาก และเป็นสาเหตุของการตายจำนวนมาก

ที่มา: เรียบเรียงจากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก (WHO) และสหพันธ์สภาวิทยาศาสตร์และสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC)

เตรียมพร้อมนับแต่บัดนี้!